

<b>PZN: 01217919</b>	<b>Datum: 18.11.2014</b>
<b>Produktname: Cholecysmon Silberperlen</b> <b>Musterprodukt vollständige Produktbezeichnung</b> Nahrungsergänzungsmittel – Nach fettem Essen	Name und Anschrift des Unternehmens: <b>Riemser Pharma GmbH</b> <b>An der Wiek 7</b> <b>17493 Greifswald - Insel Riems</b> <b>Germany</b>

Status:

- Nahrungsergänzungsmittel     Lebensmittel     diätetisches Lebensmittel  
 \_\_\_\_\_

Zutaten:

Saccharose (Süßungsmittel), Lactose (Füllstoff), Magnesiumoxid schwer (Säureregulator), Rindergallenextrakt, Trennmittel (Talkum), Verdickungsmittel (Cellulose), Kartoffelstärke (Festigungsmittel), Emulgator (Magnesiumsalz von Speisefettsäuren), Füllstoff (Hydroxypropylmethylcellulose), Feuchthaltemittel (Glycerin), Farbstoff (Eisenoxid ,schwarz), Farbstoff (Kaliumaluminiumsilicat und Titandioxid), Säureregulator (Ammoniumhydrogencarbonat), Verdickungsmittel (Xanthan Gummi), Emulgator (Zuckerglyceride), Überzugsmittel (Schellack), Stabilisator (Polyvinylpyrrolidon), Aroma Vanillin

Nährwerte:

<b>2 x 2 Filmtabletten enthalten</b>	
<i>Brennwert</i>	1,99 kcal / 8,43 kJ
<i>Fett</i>	6,99 mg
<i>Kohlenhydrate</i>	440,11 mg
<i>Eiweiß</i>	23,53 mg
<i>BE</i>	0,037

Aufbewahrungsbedingung und ggf. Verwendungsbedingung nach dem Öffnen:

Das Verfalldatum ist auf der Faltschachtel, bzw. auf dem Blister aufgedruckt. Verwenden Sie Cholecysmon® Silberperlen nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums.

Nettofüllmenge/Stückzahl/Abtropfgewicht:

25 Filmtabletten (4 g)

Gebrauchsanleitung, Zubereitungshinweis, sonstige Hinweise:

Bei der Anwendung von Cholecysmon® Silberperlen sollten anfangs 2x2 Filmtabletten, bei geringerem Bedarf kann auch die halbe Dosis, unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit, nach einer Mahlzeit, verzehrt werden.

Cholecysmon® Silberperlen sollten zügig geschluckt und nicht längere Zeit im Mund behalten werden, da sie nach Ablösung des Tablettenfilmes einen bitteren Geschmack entfalten können.

Cholecysmon® Silberperlen dürfen nicht angewendet werden, von Personen mit Erkrankungen der Verdauungsorgane, wie bei schweren Leberfunktionsstörungen, Verschluss der Gallenwege, Gallenwegserkrankungen, Gallenblasenentzündungen, Darmverschluss oder Pankreatitis.

Die Anwendung des Produktes ist ebenso ausgeschlossen unmittelbar vor oder nach einer Operation (Extraktion / Resektion) von Verdauungsorganen, sowie bei Laktoseintoleranz.

Die angegebene täglich empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie für eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.