

Liebe Patientin, lieber Patient!

427470

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

706

# Thilo-Tears® SE

Carbomer 3 mg / g

Augengel in Einzeldosisbehältnissen

904

### Zusammensetzung

1 g Augengel enthält:

**Wirksame Bestandteile:** Carbomer 3 mg.

**Weitere Bestandteile:** Sorbitol, Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-Wertes), gereinigtes Wasser.

### Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 20 bzw. 50 Einzeldosisbehältnissen zu 0,7 g Augengel.

### Stoff- oder Indikationsgruppe

Thilo-Tears SE ist ein steriles Gel, das die Tränenflüssigkeit ersetzt.

### Pharmazeutischer Unternehmer

Alcon Pharma GmbH.

Blankreutestr. 1

D-79108 Freiburg

### Hersteller

Laboratoires Alcon S.A.

23 Rue Georges Ferrenbach

F-68240 Kaisersberg

### Anwendungsgebiete

„Trockenes Auge“, Ersatz der Tränenflüssigkeit bei mangelnder oder mangelhafter Befeuchtung der Augenoberfläche.

### Gegenanzeigen

**Wann dürfen Sie Thilo-Tears® SE nicht anwenden?**

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

**Hinweis für Kontaktlinsenträger**

Während der Therapie sollten keine Kontaktlinsen getragen werden.

### Wechselwirkungen

**Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Thilo-Tears SE ?**

Bisher keine bekannt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Thilo-Tears SE nicht anders verordnet hat.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Thilo-Tears SE sonst nicht richtig wirken kann!

### Wie oft und wie lange sollten Sie Thilo-Tears SE anwenden?


Soweit nicht anders verordnet, 4mal täglich oder je nach Bedarf einen Tropfen in den Bindehautsack eintropfen.

Thilo-Tears SE ist zur Daueranwendung geeignet.

### Wie sollten Sie Thilo-Tears SE anwenden?

Das Einzeldosisbehältnis muss senkrecht gehalten werden, damit sich der Tropfen der Schwerkraft folgend ablöst. Mit dieser Technik lässt sich vermeiden, dass die Tropfengröße das Fassungsvermögen des Bindehautsackes übersteigt und die Wimpern verkleben.





1. Einzeldosisbehältnis durch leichtes Drehen und Ziehen vom Streifen abtrennen.

2. Fassen Sie das Einzeldosisbehältnis an der Etikettenseite.



## Nebenwirkungen

### Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Thilo-Tears® SE auftreten?

Gelegentlich können kurz anhaltende Sehstörungen auftreten, bis das Augengel auf der Augenoberfläche gleichmäßig verteilt ist.

*Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.*

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

*Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Etikett und Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie den Inhalt dieser Packung nicht mehr nach Ablauf dieses Datums!*

Die Einzeldosisbehältnisse vor Licht geschützt (in der Faltschachtel) aufbewahren. Einzeldosisbehältnisse immer so lagern, dass die Tropföffnung nach unten zeigt.

### Haltbarkeit nach Öffnen der Einzeldosisbehältnisses:

Thilo-Tears SE ist besonders geeignet für Patienten mit Konservierungs-mittelunverträglichkeit. Da das Augengel kein Konservierungsmittel enthält, ist das Präparat nur für eine einmalige Anwendung - sofort nach Öffnen des Behältnisses - vorgesehen.

### Stand der Information

August 2001


### Weitere Informationen im Internet

[www.trockene-augen.de](http://www.trockene-augen.de)



3. Schlagen Sie - wie bei einem Fieberthermometer - das Augengel herunter, bis es vor der Öffnung liegt.

4. Drehen Sie die Verschlusskappe ab. Durch das Abdrehen (nicht ziehen!) entsteht die saubere Tropföffnung.



5. Kopf leicht nach hinten neigen, Blick nach oben richten und mit dem Zeigefinger der freien Hand Unterlid wegziehen. Halten Sie das Einzeldosisbehältnis zum Eintropfen senkrecht über das Auge.

Drücken Sie leicht mit den Fingern das Einzeldosisbehältnis, bis sich ein Tropfen ablöst, ohne dass die Tropföffnung mit dem Auge oder Lidrand in Berührung kommt.

Für die Anwendung während einer Kontaktglasuntersuchung werden einige Tropfen Thilo-Tears® SE in den haptischen Teil des Kontaktglases getropft und dieses nach Anästhesie der Horn- und Bindehaut aufgesetzt.